

Mesalazine 外用製劑衛教單張


學名	商品名	中文名	含量/劑型
Mesalazine	Colasa enema [®]	阿腸克浣腸劑	40 毫克/毫升, 100 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 直腸炎及直腸乙狀結腸炎。

◆ **用量與用法：**

- 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- 使用浣腸劑之前，把浣腸劑放在溫水中約 10 分鐘，使藥液接近體溫的溫度。
- 在插入浣腸劑之前，先把浣腸劑搖均勻。
- 打開瓶蓋後將所附的插管接在瓶口上。
- 請用少許凡士林塗在浣腸劑之插管上，以減少插入肛門所引起的疼痛或刺激。
- 左側躺下，下方的腳(左腳)伸直、右腳彎曲朝向您的胸部以便平衡。
- 小心的把插管尖端插入您的肛門，微微指向您肚臍的方向，推進至瓶蓋口為止。
- 穩固的握住藥瓶，慢慢的壓扁藥瓶使藥液釋放至直腸內(至少 1 分鐘的時間)。
- 確定藥液完全灌入後，將藥瓶保持完全擠壓的狀況下連同插管拔出，丟掉藥瓶及插管。
- 為確保浣腸劑能治療體內，病人應維持相同姿勢 5-10 分鐘，盡量於第二天早上再去解便。



◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

- 對 mesalamine、水楊酸製劑(如 aspirin、aminosalicylates)或本藥任何成份過敏者。
- 嚴重腎損傷患者(GFR< 30 ml/min)。
- 嚴重肝損傷者。
- 2 歲以下兒童。

◆ **忘記用藥時該如何處理？**

想起時儘快補上錯過的藥劑。如已接近下次用藥時間，則跳過錯過的藥量，於下次用藥時使用正常藥量，絕對不能一次連續灌入兩劑(雙倍劑量)，這會嚴重刺激腸道，導致腹痛或腹瀉。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/06/01 修訂】

BTC00EW11-02

Mesalazine 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Mesalazine	Colasa enema [®]	阿腸克浣腸劑	40 毫克/毫升, 100 毫升/瓶

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，乾燥處避免陽光直接照射。
2. 請將藥瓶保持瓶口朝上、直立存放，可避免藥水乾涸而在瓶蓋處形成棕褐色結塊。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ 注意事項：

1. 若您患有腎臟、肝臟、心臟疾病(如心肌炎或心包炎)，或目前懷孕、計畫懷孕、哺乳，請務必主動告知醫師。
2. 曾對 **Sulfasalazine** 過敏者：治療初期需由醫師嚴密監控。若服藥後出現急性耐受不良症候群(如：急性腹痛、腹部痙攣、發燒、嚴重頭痛、出疹子)，應立即停藥並就醫。
3. 本藥可能增加曬傷風險。治療期間請**加強防曬**措施(如塗抹防曬乳、穿著遮陽衣物)，並避免長時間曝曬。
4. 若您在哺乳期間服用此藥，一旦發現嬰兒出現腹瀉症狀，請先暫停哺乳並帶嬰兒就醫。
5. 瓶口若有微量結塊屬正常現象，不影響品質。開蓋時若有結塊掉落藥水內，直接搖勻使其分散、溶解後即可正常使用。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- *嚴重過敏：全身出現嚴重紅疹、蕁麻疹、劇烈搔癢；嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨明顯腫脹；胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然沙啞。
- *腎功能異常：尿量或排尿頻率改變、排尿疼痛、下背痛。
- *肝功能異常：茶色尿或糞便顏色變白、噁心嘔吐、食慾不振、皮膚或眼睛發黃。
- *心肌炎或心包膜炎(極罕見)：胸痛、呼吸困難、心悸、心跳過快或異常。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- *輕微腹瀉、噁心、腹痛、頭痛。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/06/01 修訂】

BTC00EW11-02