

Calcitriol oint 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Calcitriol oint	Silkis oint	施革欣軟膏	30 克/條

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

小於 35%體表面積之輕度至中重度乾癬。

- ◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 每日早晚各塗擦患部一次(大清早與臨睡前)，本藥僅限外用不得內服。
3. 塗藥前請先洗淨並擦乾患部；擦完藥後請立刻用肥皂將雙手洗淨，避免誤觸眼睛或口唇。
4. 藥膏只需**薄薄塗抹一層**、摸起來微濕即可，切勿厚堆，並絕對避開眼部、眼周與嘴唇。
5. 擦藥後讓皮膚自然吸收，請勿使用保鮮膜、密不透風的貼布或紗布緊緊包覆，以免過度吸收引發副作用。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本劑有過敏性者。
2. 肝、膽、腎功能異常的病人。
3. 正在**接受全身性治療的鈣缺乏症病人**。
4. **高鈣血症或鈣代謝異常**病患。

- ◆ **忘記使用藥物時該如何處理？**

1. 想起時儘快補擦；若接近下次擦藥時間，按時使用下次劑量即可。
2. 請維持原本薄擦一層的標準用量，以免皮膚過度吸收而引發副作用。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於室溫 25°C 以下陰涼處。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

- ◆ **注意事項：**

1. 本藥膏可以擦在臉部，但臉部皮膚較嫩，剛開始擦時可能會比較容易有刺痛、發紅等刺激感，請格外留意。
2. 如果擦藥的地方出現嚴重紅腫、劇烈刺痛，或覺得乾癬反而加重，請先減少擦藥次數或暫時停藥，並回診請醫師評估。
3. 如果您目前正在**服用心臟病藥像毛地黃 Digoxin**(毛地黃易受血鈣濃度而影響藥效)、**thiazide 利尿劑**(如本院鈉離子持續錠 Natrilix SR、好悅您膜衣錠 Hyzaar)、**鈣片或是高劑量的維生素 D**，使用前請務必先告知醫師，以確保用藥安全。
4. 懷孕中或正在餵母乳的媽媽，不建議使用本藥膏。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/5/29 修訂】

BTC00EW37-02

Calcitriol oint 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Calcitriol oint	Silkis oint	施革欣軟膏	30 克/條

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*嚴重過敏與全身反應：若塗抹處出現異常劇烈發癢、冒水泡、或紅腫範圍擴大(甚至擴散到臉部、眼睛、嘴唇腫脹、呼吸困難)，請立即停止用藥、用清水洗淨並儘速就醫。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*皮膚輕微不適：擦藥部位有輕微刺痛感、發紅、脫皮或皮膚乾燥。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/5/29 修訂】

BTC00EW37-02