

Butenafine 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Butenafine	Mentax cream	黴可舒乳膏	1%, 15 克/條

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

指(趾)間黴菌病(香港腳)、圓癬(體癬)、股癬、汗斑等黴菌引起之皮膚感染症。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 先將手與患部洗淨後擦乾。擠出適量藥膏，均勻塗抹於患部及其周圍鄰近的皮膚，輕輕按摩使其吸收，表面呈現薄薄一層即可。
3. 本藥膏只能外用。擦完藥後請立刻洗手。
4. 擦完藥後請讓皮膚自然吸收。千萬不要用保鮮膜、密不透風的貼布或紗布緊緊包覆患部，以免皮膚因過度吸收引發全身性副作用，且悶熱潮濕的環境反而會讓黴菌更容易滋生。
5. 黴菌非常頑強。即使皮膚看起來已經好了或不癢了，也請遵照醫囑把療程擦滿。如果自行提早停藥，可能會再度復發，到時候會變得更難治癒。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對 Butenafine 過敏者禁用。
2. 基於交叉過敏的可能性，如果過去曾對其他 Allylamine 類抗黴菌藥膏(例如含有 Terbinafine 的療黴舒 Lamisil)有嚴重的皮膚過敏紀錄，請務必在用藥前告知醫師評估。

◆ **忘記使用藥物時該如何處理？**

1. 想起時儘快補擦；若接近下次擦藥時間，按時使用下次劑量即可。
2. 請維持原本薄擦一層的標準用量，以免皮膚過度吸收而引發副作用。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於室溫 25°C 以下陰涼處，避免陽光直射。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥膏只能擦在身體皮膚。絕對不能擦在眼睛周圍、鼻子內或嘴唇或黏膜組織，以免因強烈刺激引發紅腫刺痛。萬一不小心碰觸眼睛，請立即用大量清水沖洗。
2. 剛開始使用時，若只有輕微的局部紅、癢或乾燥，通常幾天後會逐漸適應。若覺得不舒服，可先減少擦藥次數，並於回診時告知醫師。
3. 若連續使用後症狀完全沒有減輕，甚至範圍擴大、變得更嚴重，請立即停止用藥並提早回診。這代表該症狀可能不是黴菌感染，必須由醫師重新診斷，切勿繼續塗抹。
4. 懷孕或可能懷孕的婦女，使用前請先詢問醫師或藥師評估。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/5/29 修訂】

BTC00EW38-02

Butenafine 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Butenafine	Mentax cream	黴可舒乳膏	1%, 15 克/條

5. 本藥在新生兒及嬰幼兒的安全性尚未完全建立。請勿自行讓嬰幼兒使用大人的藥膏，若寶寶有皮膚症狀，請務必先經由小兒科或皮膚科醫師診斷開立。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*嚴重過敏與全身反應：若塗抹處出現異常劇烈發癢、冒水泡、或紅腫範圍擴大(甚至擴散到臉部、眼睛、嘴唇腫脹、呼吸困難)，請立即停止用藥、用清水洗淨並儘速就醫。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*輕微刺激：發紅、發癢、發熱、皮膚乾燥、脆化。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/5/29 修訂】

BTC00EW38-02