

Clotrimazole 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Clotrimazole cream	Mycosten cream	黴克頓乳膏	10 毫克/克, 5 克/條

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療皮膚表淺性黴菌感染、如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。

- ◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 擦藥前請先將雙手洗淨。如果使用部位或周圍有髒污，請先用溫水洗淨並擦乾後再用藥。
3. 本藥限於皮膚外用，請勿吞食，並避免接觸眼睛周圍或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。若患部有深層開放性傷口或嚴重潰爛，請先由醫師評估。
4. 塗抹面積不宜過大，請以使用者本人的「兩隻手掌大小」為限。
5. 擦完藥後請讓皮膚保持自然透氣、切勿密封(如用保鮮膜或密不透風的貼布包裹)，以免悶熱讓黴菌更滋生，或因皮膚過度吸收而增加副作用。
6. 一般黴菌感染的療程至少需要 2 週以上(視感染部位而定)。即使皮膚症狀提早改善或不癢了，也必須堅持完成全部療程，才能徹底根除黴菌、防止復發。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分過敏者禁用。

- ◆ **忘記使用藥物時該如何處理？**

1. 想起時儘快補擦；若接近下次擦藥時間，按時使用下次劑量即可。
2. 請維持原本薄擦一層的標準用量，以免皮膚過度吸收而引發副作用。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於室溫 25°C 以下陰涼處，避免陽光直射。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

- ◆ **注意事項：**

1. 若連續使用後症狀完全沒有減輕，甚至範圍擴大、變得更嚴重，請立即停止用藥並提早回診。這代表該症狀可能不是黴菌感染，必須由醫師重新診斷，切勿繼續塗抹。
2. 懷孕或可能懷孕的婦女，使用前請先詢問醫師或藥師評估。
3. 本藥在新生兒及嬰幼兒的安全性尚未完全建立。請勿自行讓嬰幼兒使用大人的藥膏，若寶寶有皮膚症狀，請務必先經由小兒科或皮膚科醫師診斷開立。

- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*嚴重過敏與全身反應：若塗抹處出現異常劇烈發癢、冒水泡、或紅腫範圍擴大(甚至擴散到



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/5/29 修訂】

BTC00EW39-02

Clotrimazole 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Clotrimazole cream	Mycosten cream	黴克頓乳膏	10 毫克/克,5 克/條

臉部、眼睛、嘴唇腫脹、呼吸困難)，請立即停止用藥、用清水洗淨並儘速就醫。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*局部刺激感、灼熱感等。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/5/29 修訂】

BTC00EW39-02