

Sulconazole Nitrate 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Sulconazole Nitrate	Exelderm solution	優足達液劑	10 毫克/毫升, 10 毫升/瓶

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

足癬(香港腳)、股癬、體癬、皮膚念珠菌症、花斑癬等皮膚黴菌病的治療。

- ◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 擦藥前請先將雙手洗淨。如果使用部位或周圍有髒污，請先用溫水洗淨並擦乾後再用藥。
3. 使用後請讓藥水自然風乾。千萬不要用保鮮膜、密不透風的貼布包裹患部，以免悶熱環境反而加速黴菌滋生，或增加副作用。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分過敏者。

- ◆ **忘記使用藥物時該如何處理？**

1. 想起時儘快補擦；若接近下次擦藥時間，按時使用下次劑量即可。
2. 請維持原本薄擦一層的標準用量，以免皮膚過度吸收而引發副作用。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於室溫 25°C 以下陰涼處，避免陽光直射。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

- ◆ **注意事項：**

1. 本藥限於皮膚外用，不得內服或點眼，亦不得塗抹於眼睛周圍、口腔、鼻腔或私密處黏膜。萬一藥水不小心誤入眼睛，請立刻用大量清水沖洗。
2. 若患部有嚴重潰爛或深層大面積糜爛，請勿使用。若患部僅有輕微龜裂或局部糜爛，塗抹時可能會有短暫的刺痛感，請小心並適量使用。
3. 若連續使用後症狀完全沒有減輕，甚至範圍擴大、變得更嚴重，請立即停止用藥並提早回診。這代表該症狀可能不是黴菌感染，必須由醫師重新診斷，切勿繼續塗抹。
4. 黴菌非常頑強。儘管看起來已經好了或不癢了，也請遵照醫囑把療程擦滿。如果自行提早停藥，可能會再度復發，到時候會變得更難治癒。
5. 懷孕或可能懷孕的婦女，使用前請先詢問醫師或藥師評估。
6. 本藥在新生兒及嬰幼兒的安全性尚未完全建立。請勿自行讓嬰幼兒使用大人的藥膏，若寶寶有皮膚症狀，請務必先經由小兒科或皮膚科醫師診斷開立。

- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/5/29 修訂】

BTC00EW40-02

Sulconazole Nitrate 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Sulconazole Nitrate	Exelderm solution	優足達液劑	10 毫克/毫升, 10 毫升/瓶

*嚴重過敏與全身反應：若塗抹處出現異常劇烈發癢、冒水泡、或紅腫範圍擴大(甚至擴散到臉部、眼睛、嘴唇腫脹、呼吸困難)，請立即停止用藥、用清水洗淨並儘速就醫。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*局部刺激感、灼熱感等。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/5/29 修訂】

BTC00EW40-02