

Polyphenon E 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Polyphenon E	Veregen oint	酚瑞淨軟膏	100 毫克/克, 10 克/管

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療 18 歲以上成人之外生殖器及肛門周圍的尖形濕疣 (俗稱: 菜花)。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 先洗淨雙手並擦乾。
3. 取約 0.5 公分長的酚瑞淨軟膏塗抹於外生殖器和肛門周圍的尖形濕疣上。以手指輕輕塗開，使整個濕疣都覆蓋上一層薄薄的藥膏。通常 1 天 3 次，分早、中、晚使用。

**** 每次塗藥前不需要先洗去治療部位上殘餘的軟膏。**

**** 如果習慣在洗澡後擦藥，請務必先將患部擦乾，再塗抹藥膏。**

4. 本藥膏只能外用，且不可用於眼部、口腔、陰道內或肛門內。
5. **擦完藥後請立刻洗手。**手指上仍有軟膏時，請勿觸摸眼睛、鼻腔或口腔。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對綠茶萃取物(Polyphenon E)或本藥其它賦形劑過敏者。

◆ **忘記使用藥物時該如何處理？**

1. 想起時儘快補擦；若接近下次擦藥時間，按時使用下次劑量即可。
2. 請維持原本薄擦一層的標準用量，以免皮膚過度吸收而引發副作用。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於室溫 25°C 以下陰涼處，避光、避濕、避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。
3. 開封後可保存 6 週。
4. 請確實蓋緊鋁管的蓋子。過期或用完的空管，請安全妥善的丟棄。

◆ **注意事項：**

1. 嚴重肝功能不全的患者，不建議使用本藥。
2. 懷孕、哺乳婦女及兒童如需使用，請務必先諮詢醫師。
3. 本藥不可用於治療尿道內、陰道內、子宮頸、直腸或肛門內之尖形濕疣(菜花)。
4. **嚴禁塗抹於開放性傷口。**
5. 治療部位常有局部皮膚反應(如紅斑)發生。只要局部皮膚反應尚可接受，仍應持續治療。
6. 如發生嚴重皮膚局部反應，應以溫和肥皂和清水洗去患部的軟膏，且暫時停藥，複診時告知醫師。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/5/29 修訂】

BTC00EW41-02

Polyphenon E 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Polyphenon E	Veregen oint	酚瑞淨軟膏	100 毫克/克, 10 克/管

7. 塗抹部位不可使用任何密閉性用品(包括繃帶、防水貼布)覆蓋或包裹，並保持通風。
 8. 使用衛生棉條的女性，應先放入衛生棉條後再塗藥。若手上仍有藥膏時需要更換棉條，請務必先將雙手洗淨，避免讓藥膏不慎帶入陰道內。
 9. 未割包皮的男性，若菜花長在包皮下方，擦藥時應將包皮推開，且每天必須徹底清潔患部，避免藥膏蓄積刺激。
 10. 用藥期間**若發生性行為，應遵守以下規範：**
 - a. 在事前用溫水與溫和肥皂，將生殖器或肛門周圍的藥膏仔細沖洗乾淨。
 - b. 藥膏完全洗淨後，再採取安全防護措施(如：正確戴上保險套或使用陰道隔膜)。
 - c. 本藥膏**會破壞或減弱乳膠材質的結構**，如果藥膏沒洗乾淨就戴保險套，可能會導致保險套破裂失效。關於如何進行更安全的性行為，請諮詢醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*嚴重過敏與全身反應：若塗抹處出現異常劇烈發癢、冒水泡、破皮潰瘍或紅腫範圍擴大(甚至擴散至未塗藥處)；或者出現臉部、眼睛、嘴唇腫脹、呼吸困難等全身過敏症狀。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*輕微刺激：患部出現發紅、發癢、發熱、微痛、皮膚乾燥或脆化。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/5/29 修訂】

BTC00EW41-02