

### Doxepin 外用製劑衛教單張

| 學名          | 商品名           | 中文名  | 含量/劑型          |
|-------------|---------------|------|----------------|
| Doxepin HCl | Ichderm cream | 普膚乳膏 | 50 毫克/克；15 克/條 |

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

成人濕疹性皮膚炎(如異位性皮膚炎或單純性慢性苔癬)所致中度搔癢症之短期治療。

- ◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。藥膏只要**擦薄薄的一層**、摸起來微濕即可，千萬不要厚厚堆積在皮膚上，且應避開眼部和口唇部。本藥品為外用乳膏，絕不可吞食。
3. 擦完本乳膏後請讓它自然吸收，不可私自用貼布、緊密紗布或保鮮膜包裹。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知對主成分或任何一賦型劑過敏者。
2. 窄角性青光眼而未接受適當治療者或有尿液滯留傾向者。

- ◆ **忘記用藥時該如何處理？**

想起時儘快補上錯過的藥劑。如已接近下次用藥時間，則跳過錯過的藥量，於下次用藥時間使用正常藥量，切勿一次塗抹兩倍或額外劑量，以免過量。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：保存於 27°C 以下陰涼乾燥處，避免陽光直射。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

- ◆ **注意事項：**

1. 擦完本藥膏後，**若出現難以忍受的想睡覺(嗜睡)情形，請避免開車或操作危險機械**。您可以透過減少塗抹面積、減少每天擦藥次數或塗薄一點來改善，若症狀持續請諮詢醫師或停用。
2. 酒精會大幅加重本藥膏的想睡覺與鎮靜副作用，使用期間請避免飲酒。
3. 若您目前或近期曾服用**特定抗憂鬱藥品(俗稱單胺氧化酶抑制劑)**，簡稱 MAOIs)，必須**停藥至少 2 星期後**，才可以開始使用本乳膏。
4. 兒童使用本乳膏的安全性尚未建立，請勿自行給兒童或嬰幼兒塗抹。

- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

\*嚴重過敏：若塗抹處出現異常劇烈發癢、冒水泡、或紅腫範圍擴大(甚至擴散到臉部、眼睛、嘴唇腫脹、呼吸困難)，請立即停止用藥、用清水洗淨。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

\*局部皮膚反應：短暫的灼熱感、刺痛、發癢、乾燥、緊繃、脫皮或輕微水腫。

\*全身性反應：嗜睡、頭暈、口乾、味覺障礙、舌頭麻木感、焦慮。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/06/03 修訂】

BTC00EW42-02