

Pinaverium bromide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Pinaverium bromide	Dicetel®	得舒特膜衣錠	50 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 胃、十二指腸潰瘍、過敏性結腸、結腸炎、膽管運動困難。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
2. 請勿口含或咀嚼/咬碎，整粒藥錠以一大杯開水吞服以避免食道黏膜傷害。
3. 躺臥時或就寢前請勿服用。
4. 建議與食物一起服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥活性成分或任一賦形劑過敏的患者。
2. 半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酵素缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥對食道黏膜具刺激性，服藥後請多喝水，不要馬上躺臥以避免藥品黏著於食道。
2. 服藥後可能會發生如嗜睡的副作用，可能造成反應能力降低。在未明瞭本藥對您的影響前，請勿駕車或操作危險性機械。
3. 含有乳糖成分，半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良者請勿使用。
4. 懷孕或計畫懷孕、哺乳婦女使用前請先詢問醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏反應(如臉、唇、喉嚨腫脹、皮疹、呼吸困難、原因不明發燒等)
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
腹痛、便秘或腹瀉、頭痛、噁心、嘔吐、口乾、脹氣、吞嚥困難。