

Celecoxib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Celecoxib	Celecolen®	息骨能膠囊	200 毫克/膠囊

- ◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
緩解骨關節炎之症狀與徵兆，緩解成人類風濕性關節炎之症狀與徵兆，緩解成人急性疼痛及治療原發性經痛，緩解僵直性脊椎炎之症狀與徵兆。
- ◆ 用量與用法：
請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
- ◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：
 1. 對本藥或其賦形劑、其他非類固醇止痛消炎藥、Bokey® 伯基膠囊或磺胺類藥物過敏者。
 2. 進行冠狀動脈繞道手術後 14 天內禁用。
 3. 曾因服用非類固醇止痛消炎藥或 Bokey® 伯基膠囊而發生氣喘或蕁麻疹者。
- ◆ 忘記服藥時該如何處理？
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ 藥品儲存：
 1. 儲存環境：室溫儲存於 15°C 到 30°C 之間，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ 注意事項：
 1. 使用本品可能發生罕見但嚴重之皮膚不良/過敏反應，如用藥後發生喉痛、口腔/黏膜潰爛、皮疹等症狀，應考慮可能為藥品不良反應，宜立即就醫並考慮停藥。
 2. 服用本藥避免和含有酒精成分的飲料併服，否則會增加藥品腸胃道方面的副作用。
 3. 服用本藥可能會提高出血風險，應盡量避免攝取當歸、大蒜、薑、人蔘、甘草、綠茶等會影響凝血功能的藥物或食物。如無法避免，應注意有無不正常出血的情形。
 4. 長期使用非類固醇止痛消炎藥者，需監測肝、腎功能和糞便潛血反應。至於老年人、肝、腎功能不全患、有潰瘍病史之高危險族群，應縮短監測間隔。
 5. 腎功能不全病人應避免長期使用本藥。
 6. 本藥可能導致胎兒動脈導管過早閉合，孕婦從妊娠 30 週開始(第 3 孕期)應避免使用。
 7. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳中的婦女、有心血管疾病、肝、腎疾病、血液功能問題、氣喘等任何病史，請告知您的醫師。
 8. 請告知您的醫師和您現在服用的所有藥品，包含處方或非處方的用藥。
- ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？
 1. 如發生以下症狀時，請立即至急診就醫(過敏反應)
嚴重暈眩、呼吸急促或不規則、心跳變快或不規律、臉部或腳部因蕁麻疹腫脹，喉痛、口腔或黏膜潰爛、皮疹。
 2. 如發生以下症狀時，請立即就醫(過量或嚴重副作用)
腹部或胃灼熱或絞痛、黑便、胸痛、癲癇、不正常出血。
 3. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭痛、眼睛或皮膚變黃、浮腫、體重增加、大便顏色變深、呼吸困難、眼睛對光敏感、便秘。胃腸不適(於飯後服用可減少此副作用)。