行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院

Fluticasone furoate/Umeclidinium/Vilanterol 吸入製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Fluticasone /Umeclidinium/Vilanterol	Trelegy Ellipta®【184/55/22】	肺樂喜易利達乾粉吸入劑	F184/U55/V22 微克/劑
	Trelegy Ellipta® (92/55/22)		F 92/U 55/V 22 微克/劑

◆ **組成：**

1 每瓶含 30 次劑量。

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

Trelegy Ellipta®【184/55/22】:

1 氣喘維持治療(非供急性症狀使用)。

Trelegy Ellipta® (92/55/22):

1. 慢性阻塞性肺病(COPD)維持治療。
2. 氣喘維持治療。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其賦形劑成分過敏者
2. 本品含乳蛋白，嚴重乳蛋白過敏者請勿使用。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 一天不可使用超過 1 次。
3. 若儲放在冰箱中，使用前應放置室溫至少 1 小時使吸入器回溫後再使用。
4. 吸完藥後請漱口，漱口水請勿吞下，吐掉即可。

***使用方式：**

1. 將吸口蓋向下滑到底並暴露出吸口。此時您會聽到"喀答"一聲，同時劑量計數器會遞減 1 (如圖二)。若有聽到"喀答"聲但計數器未減 1，吸入器將不會送出藥物，請聯絡藥師或醫師。
2. 對空盡量呼氣，注意不要對著吸入劑的吸口呼氣。
3. 將吸入劑的吸口置於雙唇間，並含住吸口，以長而穩定的方式深吸一口氣，請勿由您的鼻子吸入。當手拿吸入器時，注意別讓您的手指檔住通氣孔。
4. 移開吸入器，盡可能摒住這口氣 5-10 秒，再正常呼吸。
5. 將吸口蓋向上滑動直到蓋住整個吸口(如圖一)。
6. 用水漱口，漱至喉嚨，吐出漱口水勿吞下。



[圖一]



[圖二]

***清潔方式：**

1. 如需要可在蓋上吸口蓋前，用乾面紙擦拭一下吸口，但不需要常態性的清潔。
2. 吸口蓋要吸藥時再開啟，切勿為了清潔而滑開，否則會浪費一劑藥物。

***餘藥確認：**

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/09/11 修訂】
BTC00EQ26-02

Fluticasone furoate/Umeclidinium/Vilanterol 吸入製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Fluticasone /Umeclidinium/Vilanterol	Trelegy Ellipta®【184/55/22】	肺樂喜易利達乾粉吸入劑	F184/U55/V22 微克/劑
	Trelegy Ellipta® (92/55/22)		F 92/U 55/V 22 微克/劑

1. 劑量計數器顯示數字即為剩餘劑量。
2. 當劑量剩 10 次以下，劑量計數器的左邊會呈現紅色提醒您需要準備新的吸入器。記得回診請醫師開立新藥。當劑量計數器顯示為 0 時，表示吸入器已經空了。

◆ **藥品儲存：**

1. 30°C 以下並存放於原包裝未開封的防潮鋁箔藥盒中，直到開始使用前才可將其自鋁箔藥盒中取出。
2. 吸入器自鋁箔藥盒中取出後保存期限為 1 個月，1 個月後未用畢請丟棄。建議於吸入器標籤上寫上開封日和丟棄日。
3. 如吸入器已經空了，直接丟棄於垃圾桶，確保孩童與寵物無法取得。
4. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快使用；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，不可使用兩倍劑量。

◆ **注意事項：**

1. 因一次所投與的粉末量非常少，在吸入後可能無法嚐到或感覺到藥物。如果您依照指示使用，可確信所需藥量已吸入。
2. 在吸入劑量之前，若您誤做了不只一次裝填藥物的動作(即步驟 1)，您仍然只會吸入一次劑量；然而，劑量視窗的數字會隨著裝填的劑量次數而減少。
3. 如要停止治療，建議以逐漸降低劑量之方式，不應突然停藥。
4. 為減少口腔咽喉發生念珠菌感染之機率，每次使用後應以水漱口。若口腔或喉嚨發紅或有白苔，請告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*嚴重過敏: 全身出現嚴重紅疹、蕁麻疹或劇烈搔癢；嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨明顯腫脹；伴隨呼吸困難、胸悶或聲音沙啞。

*急性呼吸加劇(矛盾性痙攣): 吸藥後突然出現劇烈喘鳴、胸悶或呼吸困難加重。

*急性閉角型青光眼: 眼睛劇痛、發紅、視力突然模糊、看燈光有光暈。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*口腔局部症狀: 口腔或喉嚨出現白斑、疼痛。

*感染徵象: 發燒、發冷、咳嗽加劇、口咽痛、身體酸痛。

*神經與心血管效應: 心悸、心律不整、手抖、頭暈、疲倦虛弱、噁心嘔吐。

*抗膽鹼與電解質效應: 口乾、口渴、排尿困難/尿滯留、肌肉痙攣。

*類固醇全身效應(罕見): 皮膚變薄容易瘀傷、皮膚顏色改變、肌肉無力、臉圓或浮腫。