

Umeclidinium/Vilanterol 吸入製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Umeclidinium/Vilanterol	Anoro Ellipta®	安肺樂易利達	U 55/ V 22 微克/劑，30 劑/瓶

◆ 組成：

- 1 一次劑量含支氣管擴張劑 Vilanterol 22mcg 及 Umeclidinium 55mcg，每瓶含 30 次劑量。

◆ 用途：（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

- 1 慢性阻塞性肺病的維持治療，**不適用於緩解急性支氣管痙攣或治療氣喘。**

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本藥或其賦形劑成分過敏者
2. 本品含乳蛋白，嚴重乳蛋白過敏者請勿使用。
3. 未與吸入性類固醇(ICS)併用時，禁用於氣喘病人。
4. 不適用於治療氣喘。

◆ 用量與用法：

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 一天不可使用超過 1 次。

*使用方式：

1. 將吸口蓋向下滑到底並暴露出吸口。此時會聽到“喀答”一聲，同時劑量計數器會遞減 1 (如圖二)。若有聽到“喀答”聲但計數器未減 1，吸入器將不會送出藥物，請聯絡藥師或醫師。
2. 對空盡量吐氣，注意不要對著吸入劑的吸口吐氣。
3. 將吸入劑的吸口置於雙唇間，並含住吸口(請勿含住通氣孔)，以長而穩定的方式深吸一口氣，勿由鼻子吸入。當手拿吸入器時，**注意別讓手指擋住通氣孔。**
4. 移開吸入器，盡可能摒住這口氣 3-4 秒，再正常呼吸。
5. 將吸口蓋向上滑動直到蓋住整個吸口(如圖一)。

*清潔方式：


1. 如需要可在蓋上吸口蓋前，用乾面紙擦拭一下吸口，但不需要常態性的清潔。
2. 吸口蓋要吸藥時再開啟，切勿為了清潔而滑開，否則會浪費一劑藥物。

*餘藥確認：

1. 劑量計數器顯示數字即為剩餘劑量。
2. 當劑量剩 10 次以下，**劑量計數器**的左邊會呈現紅色提醒您需要準備新的吸入器。記得回診請醫師開立新藥。當劑量計數器顯示為 0 時，表示吸入器已經空了。

◆ 藥品儲存：

1. 30°C 以下，避免直接受熱或日照。
2. **吸入器自鋁箔藥盒中取出後保存期限為 6 週**，6 週後未用畢請丟棄。建議於吸入器標籤



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/09/01 修訂】

BTC00EQ28-02

Umeclidinium/Vilanterol 吸入製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Umeclidinium/Vilanterol	Anoro Ellipta®	安肺樂易利達	U 55/ V 22 微克/劑，30 劑/瓶

上寫上開封日和丟棄日。

3. 如吸入器已經空了，直接丟棄於垃圾桶，確保孩童與寵物無法取得。
4. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

想起時儘快使用；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，不可使用兩倍劑量。

◆ 注意事項：

1. 每次投與的粉末量極少，吸入時可能感覺不到藥物，只要依照指示操作即可確信已獲得所需劑量。
2. 在吸入劑量之前，若您誤做了不只一次裝填藥物的動作(即步驟 1)，您仍然只會吸入一次劑量；然而，劑量視窗的數字會隨著裝填的劑量次數而減少。
3. 除非醫師指示，請勿自行停藥，若要停止治療，應遵照醫師指示以逐漸減量的方式進行。
4. 本藥不可用於緩解急性症狀且每日使用不可超過 1 次，若呼吸問題惡化、救急吸入器（迅速緩解型吸入器）的效果變差，或需要更頻繁地使用救急吸入器，應立即就醫。
5. 此藥可能會使血糖升高，糖尿病病人請小心監測血糖。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*嚴重過敏：全身出現嚴重紅疹、劇烈搔癢；嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨腫脹；伴隨呼吸困難、胸悶或聲音沙啞。

*反常性支氣管痙攣：突發性喘鳴與呼吸困難、嚴重胸悶與緊縮感、劇烈咳嗽。

*心血管與神經反應：心悸、胸痛、心跳快速、顫抖或神經緊張

*急性狹角性青光眼：眼睛劇痛、視力模糊、看見光暈、結膜充血紅眼及角膜水腫。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*排尿困難、腹瀉、咽喉炎、頭痛。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/09/01 修訂】

BTC00EQ28-02