Lebrikizumab 注射筆衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Lebrikizumab	Ebglyss Injection	異可適注射劑	250 毫克/2 毫升/筆

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

適用於治療患有中度至重度異位性皮膚炎，且無法透過外用療法適當控制疾病或不建議接受這些療法之 12 歲以上且體重至少 40 公斤病人。可併用或不併用外用皮質類固醇治療。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或賦形劑過敏者。

◆ **藥品儲存：**

1. 冷藏於2°C到8°C (36°F到46°F)，置於原藥盒中以避光。
2. 如有需要，置於原藥盒中的EBGLYSS可存放於最高30°C (86°F)的室溫最多7天。
3. 若EBGLYSS放在室溫下超過7天仍未使用，則請丟棄。一旦脫離冷藏保存，請勿放回冰箱。
4. 不可冷凍。EBGLYSS若曾冷凍，則不得使用。

◆ **用量與用法：**



1. 皮下注射使用，不可用於靜脈輸注。
2. 此注射筆限單次注射使用，使用後應予以丟棄。

注射部位：

✓ 腹部(距肚臍 5 公分之外的區域)、大腿前側(距離膝蓋或腹股溝至少 5 公分)、上手臂後側(需另一個人協助)。

✓ 每次更換注射部位。同時施打 2 針時，2 針請注射於不同部位。

✖ 勿注射於皮膚壓痛、受損、瘀青、發紅、變硬或結疤的部位，也不可注射於異位性皮膚炎(濕疹)或其他皮膚病灶部位。

使用步驟：

1. 檢查藥液是否透明，且為無色至淺黃色至淡棕色、無顆粒液體。
   (注射筆中有氣泡是正常情況，本藥是皮下注射，氣泡不會對您造成傷害)
2. 注射筆放在**室溫下 45 分鐘回溫**。
   (注射筆不可微波、淋熱水、置陽光直射處或以其他方式加溫，請讓其自行回溫。回溫後請儘速使用，勿再放回冰箱)

仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150【2026/10/13 修訂】
BTC00ED59-02

Lebrikizumab 注射筆衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Lebrikizumab	Ebglyss Injection	異可適注射劑	250 毫克/2 毫升/筆

3. 以肥皂及清水洗淨雙手並擦乾。
4. 以酒精棉片清潔注射部位的皮膚。(注射前確認注射部位已乾燥)
5. 確認注射筆已上鎖 (上鎖環指示於上鎖位置) → 基座蓋依箭頭方向旋開，注意勿碰觸針頭 (基座蓋轉開後勿再蓋回)。



(取下基座蓋時，針頭有一滴液體是沒關係的，可以施打)
(若在取下基座蓋前，即解鎖並按下紫色注射紐 → 請勿取下基座蓋，丟棄該注射筆)

6. 將透明基座平放，並緊壓皮膚 → 轉動上鎖環至解鎖位置。



7. 以大拇指**長按**紫色注射鈕，聽到響亮的喀一聲後注射筆開始注射，繼續緊壓皮膚直到聽到第二聲響亮的喀聲表示注射完成，注射最多可能需 **15 秒**。注射完成時在透明基座的頂端可看到灰色柱塞。



(注射期間可能會聽到輕微聲響，請勿移開注射筆，直到聽見第二聲響亮的喀聲)
(按住注射紐不放至注射結束並非必要，但其有助於讓您將注射筆保持穩固且緊壓住您的皮膚)

8. 注射完成後移開注射筆。注射筆丟入防穿刺的容器內。
9. 注射部位出血請以棉球或紗布按壓注射部位，請勿搓揉注射部位。

Lebrikizumab 注射筆衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Lebrikizumab	Ebglyss Injection	異可適注射劑	250 毫克/2 毫升/筆

◆ **注意事項：**

1. 治療前應先完成適合各年齡的疫苗接種。開始治療後若計劃接種任何疫苗，請先與您的醫師討論。
2. 治療期間若新發生結膜炎或結膜炎惡化，請告知您的醫師並進行眼科檢查。
3. 治療前請先治療蠕蟲感染，若治療期間發生蠕蟲感染，請與醫師討論並考慮停止 lebrikizumab 治療，直到感染緩解為止。
4. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知您的醫師。

◆ **忘記皮下注射藥品時該如何處理？**

請儘快注射遺漏掉的劑量，之後根據補打日期重新排定給藥時程。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
   - 過敏反應：搔癢、紅疹、蕁麻疹；臉部、眼瞼、嘴唇、口腔、舌頭或喉嚨腫脹；呼吸困難或喉嚨緊縮；胸悶。
   - 新出現或惡化的眼部問題，例如眼部疼痛、發紅、腫脹、發癢或視力變化。
   - 帶狀皰疹。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

   注射部位紅腫熱痛。